

## Picazón / Alergias

Puede dar cada	14-17 lbs. 6-11 mes.	18-23 lbs. 12-23 mes.	24-35 lbs. 2-3 años	36-47 lbs. 4-5 años	48-59 lbs. 6-8 años	60-85 lbs. 9-11 años
<b>Benadryl Syrup 12.5 mg/5 ml</b>	4 - 6 horas	1/2 tsp.	3/4 tsp.	1 tsp.	1 1/2 tsp.	2 tsp.
<b>Benadryl Chews</b>	4 - 6 horas				1 tab.	2 tab.

\* PRECAUCIÓN: le recomendamos que use el gotero o la copa de dosificación que viene con su medicamento para evitar la sobredosis. Las recomendaciones de dosificación en botellas pueden variar de la recomendación en estas páginas. Nos gustaría que use nuestras dosificaciones recomendadas a menos que su proveedor de atención médica le haya dado una dosis diferente. La aspirina no debe administrarse a su hijo.

**¡IMPORTANTE! POR FAVOR, LEA:** La FDA reconoce que los ingredientes en estos productos para la tos y el resfriado no han sido probados por los estándares actuales para identificar sus niveles de eficacia y seguridad. Si bien hay más estudios pendientes, los fabricantes están volviendo a etiquetar voluntariamente el uso recomendado de estos productos para "No utilizar" en niños menores de 6 años. Dada la necesidad de realizar más investigaciones, las dosis que se enumeran a continuación son las recomendaciones actuales de nuestra oficina.